

INTRODUCTION

La Forêt Montmorency est située dans les contreforts des Laurentides à 70 km au nord de la ville de Québec. Ce territoire public de 67 km², confié à l'Université Laval en 1964 pour fins d'enseignement et de recherche, est aménagé par la Faculté de foresterie et de géomatique suivant les principes du rendement soutenu en matière ligneuse et de l'utilisation polyvalente du territoire.

Cette région du bouclier laurentien présente un relief accidenté caractérisé par un plateau dont l'altitude est d'environ 750 m, percé du nord au sud par la rivière Montmorency et surmonté de collines atteignant 1000 m. Le climat froid et humide, avec une température moyenne annuelle de 0,3°C et des précipitations annuelles de 1416 mm, favorise une végétation du type boréal où domine le sapin baumier en association avec l'épinette blanche et le bouleau à papier.

La mise en œuvre d'un plan d'aménagement intégré des ressources pour ce territoire nécessite chaque année des coupes de bois qui sont réalisées suivant un modèle dit «forêt mosaïque». Il en résulte un entremêlement de peuplements d'âges et de dimensions variables avec, toujours en sous-dominance, des superficies au stade de la régénération occupées par une végétation mélangée à l'état arbustif.

Le Québec est riche en sites ornithologiques. Parmi eux, la Forêt Montmorency se démarque pour l'observation d'espèces boréales. Au moins 164 espèces d'oiseaux y ont été observées à ce jour. La fréquentation de ce site depuis plus de 30 ans par un bon nombre d'ornithologues amateurs et professionnels a permis de dresser une liste annotée des oiseaux présents pour chaque saison et ce afin de permettre aux visiteurs-observateurs de mieux apprécier l'avifaune que cette forêt boréale abrite. Alors, que ce soit pour la science ou la conservation, vous êtes cordialement invité à perpétuer l'acquisition de connaissances sur la richesse de cette forêt en rapportant vos observations, soit sur le feuillet de l'Association québécoise des groupes d'ornithologues en le retournant au Club des ornithologues de Québec (a/s Domaine Maizerets, 2000 boul. Montmorency, Québec G1J 5E7), soit sur le présent feuillet à la Forêt Montmorency (Tél. 418-846-2046).

Marianne Courteau, Marcel Darveau et Paul Bouliane ont préparé les textes et la liste annotée de ce dépliant. André Desrochers, Bruno Drolet, Jacques Ibarzabal et Isabelle Leclerc ont fourni des données et ont revu le manuscrit. La nomenclature utilisée dans ce dépliant est celle proposée par la Commission internationale des noms français des oiseaux (Devillers et Ouellet, 1993. Éditions MultiMondes, Ste-Foy). Cette liste était à jour en septembre 1997. L'illustration de la page couverture représente un Mésangeai du Canada par Marianne Courteau.

LÉGENDE DE LA LISTE

Les différentes catégories utilisées concernant le statut et la constance d'observation sont inspirées de la liste commentée des oiseaux du Québec (David, 1996. Association québécoise des groupes d'ornithologues).

Statut

NR: Nicheur Résidant: Niche et passe l'hiver sur le territoire de la forêt Montmorency.

NM: Nicheur Migrateur: Niche à la forêt Montmorency mais qui passe l'hiver hors du territoire.

E: Estivant: Espèce présente en période de reproduction, dont la nidification est possible mais n'a pas été confirmée.

M: Migrateur de passage: Ne niche pas à la forêt Montmorency mais que l'on rencontre dans ce secteur lors de migrations printanières ou automnales.

V: Visiteur: Espèce qui habituellement ne se rencontre pas à la forêt Montmorency mais qui s'y est égarée, est loin de son aire de distribution normale ou a dévié de son corridor de migration.

H: Hivernant: Se retrouve à la forêt Montmorency en dehors de la saison de nidification.

Constance d'observation

I: Inusité: Ne s'observe pas à chaque année.

R: Rare: Généralement observé au cours d'une saison, mais soit peu souvent, soit localement.

P: Peu commun: Présent en petit nombre. L'observation de cette espèce demande un effort de recherche.

C: Commun: Peut être observé assez facilement chaque jour.

A: Abondant: Peut être observé facilement et en grand nombre chaque jour.

Les cotes de constance d'observation attribuées à chaque espèce correspondent à une période où la tordeuse des bourgeons de l'épinette est endémique. Il faut donc prendre en considération que lors des années d'épidémie de tordeuse certaines espèces, par exemple la Paruline tigrée ou la Paruline à poitrine baie, peuvent devenir communes, voire même abondantes.

Printemps = mars, avril, mai.

Été = juin, juillet.

Automne = août, septembre, octobre, novembre.

Hiver = décembre, janvier, février.

	Espèce	Statut	Constance d'observation			
			Printemps	Été	Automne	Hiver
	Plongeon Huard	E	P	P	P	
	Cormoran à aigrettes	V			I	
	Butor d'Amérique	E	R	R	R	
	Grand Héron	E	P	P	P	
	Bihoreau gris	E	R	R	R	
	Oie des neiges	M			R	
	Bernache du Canada	M	R	I	R	
	Sarcelle à ailes vertes	M	I	I	I	
	Canard noir	NM	P	P	P	
	Canard branchu	M	I	I		
	Canard colvert	E	R	R	R	
	Canard pilet	V			I	
	Sarcelle à ailes bleues	E	I	I	I	
	Fuligule à collier	NM	P	P	P	
	Fuligule milouinan	V			I	
	Macreuse à front blanc	M			I	
	Garrot à oeil d'or	NM	P	P	P	
	Garrot d'Islande	M	I			
	Petit Garrot	M			I	
	Harle couronné	V		R	I	
	Grand Harle	NM	P	P	P	
	Harle huppé	M		I	I	
	Érismature rousse	V			I	
	Urubu à tête rouge	V	R	R		
	Balbusard pêcheur	E	R	R	R	
	Pygargue à tête blanche	V	I	I	I	I
	Busard Saint-Martin	M	I	I	I	
	Épervier brun	NM	P	P	P	
	Épervier de Cooper	V		I		
	Autour des palombes	NR	R	R	R	R
	Petite Buse	E	R	R	R	
	Buse à queue rousse	NM	R	R	R	
	Buse pattue	M	I			
	Aigle royal	V		I		
	Crécerelle d'Amérique	NM	R	R	R	
	Faucon émerillon	NM	R	R	R	
	Tétras du Canada	NR	C	P	P	P
	Gélinotte huppée	NR	C	P	P	P
	Pluvier semipalmé	M	R		R	
	Pluvier kildir	NM	P	P	P	
	Grand Chevalier	M			I	
	Petit Chevalier	M			I	
	Chevalier solitaire	E	R	R	R	
	Chevalier grivelé	NM	C	C	C	
	Bécasseau sanderling	V			I	
	Bécasseau semipalmé	V	I		I	
	Bécasseau à croupion blanc	V				
	Bécassine des marais	NM	R	R	R	
	Bécasse d'Amérique	NM	I	I		
	Goéland à bec cerclé	V		I	I	
	Goéland argenté	E	P	P	P	
	Pigeon biset	V		I		
	Tourterelle triste	V	I	I		
	Grand-duc d'Amérique	NR	R	R	R	R
	Chouette épervière	E	I	I	I	I
	Chouette lapone	V	I			I
	Nyctale de Tengmalm	NR	R	R	R	R
	Petite Nyctale	V		I		
	Engoulevent d'Amérique	V		I		
	Engoulevent bois-pourri	V		I		
	Martinet ramoneur	M		I		
	Colibri à gorge rubis	NM	R	R	I	
	Martin-pêcheur d'Amérique	NM	P	P	P	
	Pic maculé	V	R	R		

☒	Espèce	Statut	Constance d'observation			
			Printemps	Été	Automne	Hiver
	Pic mineur	NR	P	P	P	P
	Pic chevelu	NR	P	P	P	P
	Pic tridactyle	H			I	I
	Pic à dos noir	NR	P	P	P	P
	Pic flamboyant	NM	P	P	R	
	Grand Pic	V	I	I	I	I
	Moucherolle à côtés olive	NM	P	P	R	
	Pioui de l'Est	V		I		
	Moucherolle à ventre jaune	NM	C	C	R	
	Moucherolle des aulnes	NM	C	C	R	
	Moucherolle tchébec	NM	R	R	I	
	Moucherolle phébi	V	I			
	Tyrann tritri	V	I	I		
	Alouette hausse-col	V	I		I	
	Hirondelle bicolor	NM	C	C	R	
	Hirondelle de rivage	NM	R	R		
	Hirondelle à front blanc	V		I		
	Hirondelle rustique	NM	C	C	R	
	Mésangeai du Canada	NR	C	C	C	C
	Geai bleu	M	P	R	R	
	Corneille d'Amérique	NM	P	C	C	I
	Grand Corbeau	NR	P	P	P	P
	Mésange à tête noire	NR	P	P	P	P
	Mésange à tête brune	NR	C	C	C	C
	Sittelle à poitrine rousse	NR	P	P	P	P
	Sittelle à poitrine blanche	V	I			
	Grimpereau brun	NR	R	R	R	
	Troglodyte familier	V		I		
	Troglodyte mignon	NM	A	A	A	
	Roitelet à couronne dorée	NM	A	A	C	P
	Roitelet à couronne rubis	NM	A	A	C	
	Merlebleu de l'Est	E	R	R	R	
	Grive fauve	NM	R	R	I	
	Grive de Bicknell	E	R	R		
	Grive à dos olive	NM	A	A	A	
	Grive solitaire	E	R	R		
	Grive des bois	V	I			
	Merle d'Amérique	NM	C	C	C	R
	Moqueur polyglotte	V	I			
	Moqueur roux	V	I			
	Pipit d'Amérique	M			I	
	Jaseur boréal	H	I		I	I
	Jaseur d'Amérique	E		P	P	
	Pic-grièche grise	H	R		R	R
	Etourneau sansonnet	V	I	I	I	
	Viréo à tête bleue	NM	P	P	R	
	Viréo de Philadelphie	NM	P	P		
	Viréo aux yeux rouges	NM	R	R		
	Paruline obscure	NM	P	P	P	
	Paruline verdâtre	V		I		
	Paruline à joues grises	NM	C	C	C	
	Paruline à collier	V	R	R		
	Paruline jaune	NM	R	R		
	Paruline à flancs marron	E	R	R		
	Paruline à tête cendrée	NM	A	A	C	
	Paruline tigrée	NM	P	P	P	
	Paruline bleue	E	R		I	
	Paruline à croupion jaune	NM	A	A	A	
	Paruline à gorge noire	NM	C	C	C	
	Paruline à gorge orangée	NM	R	R		
	Paruline à poitrine baie	NM	C	C	R	
	Paruline rayée	NM	A	A	C	
	Paruline noir et blanc	E	I	I		

☒	Espèce	Statut	Constance d'observation			
			Printemps	Été	Automne	Hiver
	Paruline flamboyante	NM	C	C	P	
	Paruline couronnée	E	R	R		
	Paruline des ruisseaux	NM	P	P	R	
	Paruline triste	NM	C	C	R	
	Paruline masquée	NM	C	C	R	
	Paruline à calotte noire	NM	C	C	C	
	Paruline du Canada	NM	R	R		
	Cardinal à poitrine rose	M	I		I	
	Passerin indigo	V	I			
	Bruant hudsonien	M	R		R	
	Bruant familier	NM	R	R	R	
	Bruant vespéral	V	R	R	I	
	Bruant des prés	E	R	R		
	Bruant fauve	NM	R	R	R	
	Bruant chanteur	E	R	R		
	Bruant de Lincoln	NM	C	C	P	
	Bruant des marais	NM	P	P	P	
	Bruant à gorge blanche	NM	A	A	A	
	Bruant à couronne blanche	M	R		R	
	Junco ardoisé	NM	A	A	A	R
	Bruant lapon	V	I			
	Bruant des neiges	H	R		R	R
	Goglu des prés	M	R			
	Carouge à épaulettes	NM	R	R	R	
	Quiscale rouilleux	NM	P	P	R	
	Quiscale bronzé	E	R	R	R	
	Vacher à tête brune	M	R	I	R	
	Durbec des sapins	NR	R	R	R	C
	Roselin pourpré	NR	P	P	P	P
	Bec-croisé des sapins	NR	R	R	R	R
	Bec-croisé bifascié	NR	A	A	A	A
	Sizerin flammé	H	R		R	P
	Sizerin blanchâtre	H	I		I	I
	Tarin des pins	NR	A	A	A	A
	Chardonneret jaune	E	R	R	R	
	Gros-bec errant	NR	P	P	P	P
	Moineau domestique	V				I

Observateur(s):

Date:

Notes:

LES OISEAUX DE LA FORÊT MONTMORENCY

LISTE ANNOTÉE
pour les quatre saisons



Université Laval
et
Club des ornithologues de Québec